

RACCOMANDAZIONI ASLTO3

Comparsa di sintomi a scuola:

[temp > 37,5°C, mal di gola, congestione nasale, tosse, nausea/vomito, cefalea, diarrea, mialgie, diminuzione del gusto e dell'olfatto]

Il referente scolastico (referente COVID) contatta i genitori, l'alunno attende in una zona separata (Aula n.4_ Aula COVID) con mascherina chirurgica assistito da personale scolastico dotato di mascherina chirurgica e mantenendo il distanziamento fisico di almeno 1 metro

Comparsa di sintomi a CASA:

[temp > 37,5°C, mal di gola, congestione nasale, tosse, nausea/vomito, cefalea, diarrea, mialgie, diminuzione del gusto e dell'olfatto]

L'alunno deve stare a casa

I genitori comunicano alla scuola l'assenza per motivi di salute

I genitori contattano il Pediatra/Medico di famiglia

TRIAGE TELEFONICO

Sospetto COVID

Altra patologia (tonsilliti, otiti...)

PLS/MMG richiede test diagnostico al SISP che lo esegue; **isolamento fiduciario attivo per tutti i contatti stretti in attesa dell'esito del tampone (genitori e compagni di classe vanno al lavoro/scuola ed evitano i contatti sociali)**

Lo studente non va a scuola fino a guarigione clinica secondo le valutazioni del medico

POSITIVO

i **contatti stretti** vengono messi in quarantena (14 gg);(tra i soggetti che hanno avuto contatti diretti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi) si procede con la sanificazione delle aree interessate.

La conferma di avvenuta guarigione si ha con l'effettuazione di 2 tamponi negativi a distanza di 24 h. In caso contrario prosegue l'isolamento.

NEGATIVO

A giudizio del medico si ripete il test dopo 2/3 gg

Rimane a domicilio fino a guarigione clinica

Rientro a scuola con certificato di guarigione clinica:
< 6 aa con certificato medico
> 6 aa con autocertificazione del genitore

Attestato: Il paziente può rientrare perché è stato eseguito il test diagnostico-terapeutico e di prevenzione per il COVID